

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-3-70 086817

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 2 au Bulletin du mois d'Août 1970

13 Août 1970

## Information

### VIGNE

#### ARAIGNEES ROUGES

La période chaude enregistrée au début du mois d'Août a été favorable à une nette reprise d'activité des Araignées rouges et leur présence a pu être observée dans des parcelles considérées jusqu'ici comme épargnées, notamment dans certains secteurs des vignobles de BARR, DAMBACH-LA-VILLE et SCHERWILLER (67).

Nos observations n'ayant pu porter sur l'ensemble du vignoble, nous conseillons aux viticulteurs d'apporter un soin particulier à la reconnaissance de ces ravageurs dans leurs parcelles, de façon à pouvoir intervenir si nécessaire.

Dans les parcelles contaminées par l'Araignée rouge et principalement sur celles n'ayant pas fait l'objet d'un traitement de printemps, effectuer un traitement acaricide spécifique dans les prochains jours et avant le 20 Août.

Pour le choix du produit, se reporter à la liste en votre possession.

La plupart des produits recommandés ayant une action de contact, veiller à ce que la pulvérisation touche l'ensemble du feuillage lors du traitement.

#### OIDIUM

L'Oïdium de la vigne commence à se manifester dans certains vignobles. Nous recommandons aux viticulteurs d'être vigilants et, le cas échéant, de prévoir un traitement.

## Avertissement

### ARBRES FRUITIERS

- POMMIER - POIRIER -

#### CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le contrôle des vols de la deuxième génération du Carpopapse se poursuit, tant par piégeage lumineux que par piégeage alimentaire, dans des vergers fortement contaminés par la première génération de ce ravageur.

.../...

Jusqu'à ce jour, l'activité des papillons de ce deuxième vol est pratiquement inexistante. Les vols risquent cependant de se manifester avec une certaine intensité si les températures crépusculaires devaient s'élever.

En conséquence, un nouveau traitement insecticide ne s'avère pas économiquement rentable dans l'immédiat, sauf si l'on cherche une protection parfaite des fruits (fruits de luxe par exemple). Donc, attendre un nouvel avis pour intervenir.

#### GRANDES CULTURES

##### - BETTERAVES INDUSTRIELLES -

#### CERCOSPORIOSE

Les brouillards matinaux que nous connaissons actuellement sont favorables à une extension rapide de la Cercosporiose sur les variétés sensibles à cette maladie.

Renouveler la protection fongicide, notamment sur la variété Précopoly dans les parcelles contaminées de la région de SPECHBACH-LE-HAUT (68).

#### Information

#### CULTURES MARAICHIERES

##### - POIREAU -

#### TEIGNE DU POIREAU

Des vols massifs de Teigne du poireau sont enregistrés depuis quelques jours dans nos élevages. Un traitement insecticide devrait être réalisé dès réception.

Renouveler cette application 10 à 12 jours plus tard.

Parmi les produits recommandés, respecter strictement les délais d'emploi avant la récolte :

- Parathion éthyl	: 15 jours avant la récolte.
- Parathion méthyl	: 15 " " "
- Diazinon	: 15 " " "
- Malathion	: 7 " " "
- Lindane	: 15 " " "
- D.D.T.	: 15 " " "

Le Responsable de la Station  
D'Avertissements Agricoles :  
C. GACHON.

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux :  
J. HARRANGER.